

★ 検査当日は、この用紙を必ずご持参下さい ★

造影 CT 検査を受けられる方へ糖尿病薬の服用確認

患者氏名： 様

糖尿病薬のうち、ビグアナイド系の糖尿病薬（下記一覧表参照）を服用されている方の場合、頻度はまれですが、造影 CT 検査後に、乳酸アシドーシスという重篤な副作用が起こる事があります。

乳酸アシドーシスとは、初期症状として食欲不振、嘔気・嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸症状が急激に出現し、進行すると倦怠感、筋肉痛・痙攣、脱力感、腰痛、胸痛、過呼吸、脱水、低血圧などを引き起こし、昏睡状態に陥る事もあります。

万一の副作用を防止するため、ビグアナイド系の糖尿病薬を服用されている方は、造影 CT 検査 48 時間前から服用せず、検査後も 48 時間は服用なさらないで下さい。

この間これらの糖尿病薬を服用しないことにより血糖値が一時的に上昇する可能性があります。中止するお薬や注意事項については主治医の指示に従って下さい。

ビグアナイド系糖尿病薬

2022 年 3 月現在

一般名	商品名
メトホルミン塩酸塩	メトグルコ、メトホルミン塩酸塩、グリコラン
ブホルミン塩酸塩	ジベトス、ジベトン S
メトホルミン塩酸塩含有の配合薬	メタクト配合錠、イニシンク、エクメット、メトアナ

- 1) 糖尿病薬の服用 ☐ あり ☐ なし
- 2) 「あり」の方でビグアナイド系糖尿病薬の服用 ☐ あり ☐ なし
- 3) ビグアナイド系糖尿病薬服用中であれば

検査 48 時間前から検査後 48 時間（検査日含め 5 日間）中止して下さい。

中止期間 月 日 ~ 月 日

○ 検査 48 時間前から休薬をしていない場合は検査を延期させて頂く事もあります。

主治医：

年 月 日

本人署名

保護者または

代理人署名